에탄올 유발 증상 설문지 (Ethanol-induced symptom questionnaire)

다음과 같은 증상이 있습니까? (Have you noticed any of the following symptoms?)								
	도세탁셀 투여 (docetaxel administration)							
	투여 전 (Before)		투여 중 (During)		투여 종료 후 30분 이내 (within 30 minutes from completion)		투여 종료 후 24시간 (24 hours from completion)	
	예 (Yes)	아니오 (No)	예 (Yes)	아니오 (No)	예 (Yes)	아니오 (No)	예 (Yes)	아니오 (No)
1. 현기증 (Dizziness)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. 말하기 어려움 (Difficulty speaking)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. 불안정한보행 (Unsteady walking)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. 균형 장애 (Impaired balance)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. 기분의 변화 (Mood swings)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. 반응이 느림 (Slower reactions)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. 홍조 (Facial flushing)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. 두통 (Headache)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. 구역 (Nausea)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. 두근거림 (Palpitation)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11. 흐릿하게 보임 (Blurred vision)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

S1 Fig. Korean version of ethanol-induced symptom questionnaire.